

DithaneTM NT 80 WP

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - DITIOCARBAMATO MANCOZEB

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS**

Composición química:

	p/p
Manganeso ethylenebis (dithiocarbamate polymeric, complex with zinc salt).....	80,00 %
Ingredientes inertes.....	20,00 %
Total.....	100,00 %

Contiene: 800 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE.

DENSIDAD: 0,41 g/mL a 20 °C.

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



FORMULADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia, S.A.
Carrera 50 No. 13-209. Soledad, Atlántico, Colombia. Teléfonos: 375-9300 / 018000916012

® TM Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

Dithane™ NT 80 WP

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - DITIOCARBAMATO MANCOZEB

USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

Dithane™ NT 80 WP es un fungicida preventivo de contacto que inhibe el desarrollo del tubo germinativo de la espora del hongo ya que bloquea los procesos enzimáticos a nivel de citoplasma y mitocondria, lo que ocasiona una deficiencia de ATP en la célula.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Durante el uso y manejo de **Dithane™ NT 80 WP** use el equipo de protección consistente en anteojos, mascarillas, guantes, botas de hule y overol de mangas largas. No coma, beba o fume durante el manejo y aplicación de este producto. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento. Antes de usar **Dithane™ NT 80 WP** calibre con agua el equipo de aspersión, para verificar que está aplicando la dosis correcta.

Dithane™ NT 80 WP puede ser aplicado con cualquier tipo de boquilla, preferiblemente de cono hueco y equipo de fumigación aéreo o terrestre.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Al preparar la mezcla llene el tanque a la mitad con agua y vierta la dosis completa de **Dithane™ NT 80 WP** que va a utilizar y mézclelo; posteriormente complete el agua a utilizar. Si utiliza mezclas con **Dithane™ NT 80 WP** con otros pesticidas haga premezclas por separado y luego vierta al tanque la mezcla. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo con el tanque de la aspersora, debe utilizar una balanza o copa de medida de 25 mL. Después de la aplicación lave el equipo de protección y el equipo de aplicación, báñese bien con agua y jabón y póngase ropa limpia. La ropa utilizada no deberá usarla sin ser previamente lavada.





Dow AgroSciences

Dithane™ NT 80 WP

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - DITIOCARBAMATO MANCOZEB**RECOMENDACIONES DE USO:**

PAÍS	CULTIVOS	PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS RECOMENDADA
	Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>	
	Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Tizón temprano <i>Alternaria solani</i> Antracnosis <i>Colletotrichum phomoides</i> Mancha gris <i>Stemphylium solani</i> Septoriosis <i>Septoria lycopersici</i>	
Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá República Dominicana.	Pepino <i>Cucumis sativus</i> Melón <i>Cucumis melo</i> Sandía <i>Citrullus vulgaris</i>	Mildiu veloso <i>Pseudoperonospora cubensis</i> Antracnosis <i>Colletotrichum lagenarium</i> Roña <i>Cladosporium cucumerinum</i> Gomosis <i>Mycosphaerella citrulina</i>	La dosis de Dithane™ NT 80 WP es de 2 - 3 kg/ha (1,5 a 2 kg/mz). Usar 1 - 1,5 kg / 200 litros de agua.
	Cebolla <i>Allium cepa</i>	Mildiu velludo <i>Pseudoperonospora destructor</i> Mancha púrpura <i>Alternaria porri</i>	En arroz usar 5 kg / ha en 80 litros de agua con equipo aéreo.
	Maní <i>Arachis hipogaea</i>	Mancha foliar <i>Cercospora arachidicola</i>	Con equipo terrestre usar 120 litros de agua.
	Arroz <i>Oryza sativa</i>	Añublo <i>Pyricularia oryzae</i> Mancha lineal <i>Cercospora oryzae</i> Mancha circular <i>Helminthosporium oryzae</i>	
	Papaya <i>Carica papaya</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum spp.</i>	
	Banano y plátano <i>Musa spp.</i>	Sigatoka negra <i>Mycosphaerella fijensis</i>	
	Crisantemos <i>Chrysanthemum morifolium</i> Rosas <i>Rosa spp.</i> Clavel <i>Dianthus spp.</i>	Mancha negra <i>Diplocarpon rosae</i> Moho gris <i>Botrytis cinerea</i> Antracnosis <i>Colletotrichum spp.</i>	
Panamá.	Cucurbitáceas	Mildiu veloso <i>Pseudoperonospora cubensis</i> Antracnosis <i>Colletotrichum lagenarium</i> Roña <i>Cladosporium cucumerinum</i> Gomosis <i>Mycosphaerella citrulina</i>	La dosis de Dithane™ NT 80 WP es de 2 - 3 kg/ha (1,5 a 2 kg/mz).
Costa Rica.	Mango <i>Mangifera indica</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum gloesporioides</i>	0,9 - 1,8 kg/200 L de mezcla.



Dow AgroSciences

DithaneTM NT 80 WP

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - DITIOCARBAMATO MANCOZEB

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Empezar las aplicaciones con los primeros indicios de daño. Mantener frecuencia de aplicación de cada 5 a 8 días. En arroz aplicar por lo menos dos veces, una en el embuchamiento y la otra 10 días después. Para mango realizar aplicaciones cada 8 - 10 días, para un máximo de 3 aplicaciones.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Se debe dar un plazo no menor de 10 días. En banano no existe restricción. Si va en mezcla con otro agroquímico ver en el panfleto la restricción del mismo.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Las áreas tratadas con **DithaneTM NT 80 WP** pueden ser inspeccionadas 24 horas después de efectuada la aplicación. Si va en mezcla con otro agroquímico ver en el panfleto la restricción del mismo.

FITOTOXICIDAD:

No presenta fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD:

DithaneTM NT 80 WP es compatible con la mayoría de los plaguicidas existentes en el mercado, se recomienda realizar la premezcla en agua con los productos a utilizar.



DithaneTM NT 80 WP

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - DITIOCARBAMATO MANCOZEB

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico y pecuario en general. Almacénesse en su envase original con su etiqueta y panfleto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y en un ambiente fresco y bien ventilado. En caso de derrames, utilice algún material absorbente como aserrín y recoja con una pala, entierre en un agujero lejos de fuentes de agua, casas de habitación y áreas de pastoreo.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Náuseas, vómitos, cólicos, pérdida de peso y pérdida de apetito. El contacto prolongado puede causar dermatitis. El rocío puede causar irritación de la garganta.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Haga que la persona beba un vaso de agua si es que puede tragarla. No induzca el vómito a menos que así lo recomiende el centro de control de intoxicaciones o el médico. Nunca administre nada por la boca cuando la persona se encuentra inconsciente.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua.

POR INHALACIÓN: Lleve el paciente a un lugar bien ventilado.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese durante 15 minutos con abundante agua limpia.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información Toxicológica. Centro de Intoxicaciones.	(502) 2230-0807 (502) 2232-0735
Belice	Unidad de Epidemiología.	(501) 223-1639
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 2232-2322
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 ext. 17
Costa Rica	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones.	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos.	(507) 523-4948 (507) 523-4968
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan) Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello	(809) 684-3478/3672 (809) 681-7828

DithaneTM NT 80 WP

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - DITIOCARBAMATO MANCOZEB

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

**CONSULTE AL PROFESIONAL
EN CIENCIAS AGRÍCOLAS, ANTES DE
COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.**

**PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS
RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.**

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES
CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES
O EMPAQUES VACÍOS.**

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y deposítelos en un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES
EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO
LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente, no se responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipulado en este panfleto y etiqueta.

PAÍS	No. DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	479-52	28-06-2001
EL SALVADOR	AG.96-05-325	16-07-1999
HONDURAS	10-5-II	06-06-2001
COSTA RICA	48	10-03-1995
NICARAGUA	DW-014D-4-98	11-04-2003
PANAMÁ	1641	08-07-2004
REP. DOMINICANA	2304	06-02-2003