

Grazon™

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - LS + GRÁNULOS DISPERSABLES

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“CONSERVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

INGREDIENTES ACTIVOS:

Concentrado soluble en agua:

Picloram: Ácido 4-amino-3,5,6-tricloropicolínico en forma de sal potásica,
240 gramos de equivalente ácido, por litro de formulación a 20°C

Gránulos dispersables en agua:

Metsulfuron metil ⁽¹⁾ : Metil 2((((((4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2il)amino)carbonidil)-amino)-sulfonil)benzoato) 600 g/kg.

HERBICIDA PARA EL CONTROL DE MALEZAS DE HOJA ANCHA EN POTREROS

Reg. M.A.G.: 077-H

“ESTE HERBICIDA ESTÁ SUJETO A LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA LEY
073 REGISTRO OFICIAL 442 DE DE 1990 - 05 - 22”

FABRICADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.

Transversal 18 No.96-41 Piso 7°.
Bogotá - Colombia



Dow AgroSciences

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

FarmAgro S.A.

Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7
Junto a Sal. Del Pacífico, Manzana 263
Parque Industrial Vergeles
Teléfono: 04 2590600 Guayaquil, Ecuador



El compadre del agro

® ™ Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

(1) Producto de Dupont

P.V.P.

CUIDADO

Grazon™

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - LS + GRÁNULOS DISPERSABLES

MODO DE EMPLEO:


Grazon™ es un herbicida selectivo y sistémico recomendado para controlar malezas de hoja ancha leñosas, semileñosas y herbáceas que crecen en potreros.

INSTRUCCIONES PARA SU USO

Aplique **Grazon™** en forma de aspersión mezclado con agua, **no se mezcle con aceite o ACPM**, cuando las malezas están en activo crecimiento (entre 40 y 100 cm.) o antes de floración. Estas condiciones se presentan una vez establecido el período de lluvias o cuando exista suficiente humedad en el suelo.

Para preparar la mezcla de **Grazon™** disuelva los gránulos en el líquido agitando vigorosamente el envase durante 15 segundos o hasta obtener una mezcla uniforme. Vierta la cantidad recomendada para su aplicación en la mitad del agua requerida y agite bien. Luego adicione el agua restante agitando. Proceda inmediatamente a su aplicación. Agite siempre la mezcla antes de llenar el equipo de aspersión.

La elección de la dosis está basada en la especie de la maleza a tratar, su tamaño y consistencia. Preferiblemente debe aplicarse a malezas tiernas en plena actividad de crecimiento.



Grazon™

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - LS + GRÁNULOS DISPERSABLES

MALEZAS QUE CONTROLA

Malezas de Consistencia Herbácea (Dosis Baja)

Alcanforada (*Hyptis suaveolens*), Bicho (*Cassia tora*), Bledo (*Amaranthus* sp.), Cafecillo (*Cassia occidentalis*), Catarama (*Mimosa pudica*), Pata de tórtola (*Croton hirtus*), Rabo de Alacrán (*Heliotropium indicum*).

Malezas de Consistencia Leñosa (Dosis Alta)

Bálsamo chaparro (*Mirospermum frutescens*), Bocachica (*Thalia geniculata*), Escoba blanca (*Melochia parviflora*), Escoba dura (*Sida acuta*), Espino (*Pithecolobium lanceolatum*), Helecho (*Pteridium aquilinum*), Malva (*Malachra alceifolia*), Mortiño (*Clidemia rubra*, *Clidemia capitellata*), Mosquero (*Croton leptostachyus*), Pata de vaca (*Bauhinia divaricata*), Pega Pega (*Desmodium* sp.), Zarza (*Mimosa pigra*), Soldado parado (*Chelonanthus* sp.).

RECOMENDACIONES

TRATAMIENTO	ENVASES Grazon™	AGUA
GENERAL (Áreas densamente pobladas de malezas)		
Malezas de consistencia herbácea	2	400 l/ha
Malezas leñosas	4	
Calibre bien su equipo de aspersión antes de hacer la aplicación del herbicida. Se recomienda trabajar el equipo disponible a una presión de descarga baja, cercana a 30 p.s.i.		
LOCALIZADO (Áreas con malezas diseminadas en manchones)		
Malezas de consistencia herbácea	1	200 l
Malezas leñosas	2	
Utilice equipos de aplicación de espalda, bestia o estacionario. Humedezca bien el follaje de la maleza.		
BOMBA DE ESPALDA (5 GALONES)		
Malezas de consistencia herbácea	1/2 medida (*)	20 l
Malezas leñosas	1 medida (*)	
(*) Utilice las medidas indicadas dentro de la tapa dosificadora del envase. (Raya de abajo = 1/2 medida, Raya de arriba = 1 medida)		



Grazon™

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - LS + GRÁNULOS DISPERSABLES

NOTA: Se recomienda sacar el ganado del potrero antes de aplicar **Grazon™** y reintroducirlo después de 24 horas de tratado.

COMPATIBILIDAD:

Grazon™ es compatible con la mayoría de plaguicidas existentes en el mercado. Debe mezclarse únicamente con agua, nunca con aceite o diesel.

AVISO AL COMPRADOR:

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente excesivo o indebido por parte del consumidor.



Grazon™

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - LS + GRÁNULOS DISPERSABLES

Precaución: El producto puede ser nocivo si se ingiere o se inhala e irritante en caso de contacto con la piel y los ojos.

**Durante la preparación y utilización del producto:
NO FUMAR - COMER O BEBER**

Evitar la ingestión, inhalación de vapores o sustancias nebulizadas y el contacto del producto con la boca, la piel y los ojos.

**Usar guantes o botas de goma,
gafas y ropa de protección.**

Después de la aplicación y antes de comer-beber o fumar, sacarse la ropa contaminada, lavarse con abundante agua y jabón las manos y las partes expuestas de la piel y lavar perfectamente todo el equipo utilizado.

FRASES DE ADVERTENCIA

- El producto debe manejarse siguiendo las buenas prácticas agrícolas y las normas de manejo seguro de plaguicidas.
- Conservar el producto lejos de bebidas, alimentos y medicamentos de consumo humano o animal.
- No emplear el envase para ningún otro fin. Destruyalo y entierre en lugar seguro.
- En caso de derrame recoja el producto con un material absorbente y entérrelo en un lugar seguro.
- No aplicar el producto en las superficies que pueden entrar en contacto con los alimentos.
- Antes de destruir el envase enjuagarlo con agua (cuarta parte del contenido) por lo menos tres veces y los residuos viértalos en el equipo de aplicación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No permita que la aspersión caiga sobre plantas susceptibles como alfalfa, hortalizas, algodón, etc.
- No efectuar aplicaciones con el viento dirigido hacia cultivos susceptibles.
- No sembrar cultivos de hoja ancha en áreas tratadas hasta asegurarse que no existen residuos en el suelo.

INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS

- En caso de **CONTAMINACIÓN** sacar al paciente del área tratada, quitarle la ropa contaminada y lavar las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón.
- Para el caso de **INGESTIÓN** no existe antídoto específico. **INDUZCA EL VÓMITO.**
- En caso de **INHALACIÓN** sacar al paciente del área en peligro y llevarlo a un lugar fresco y ventilado. **Consultar a un médico y mostrarle la etiqueta.**
- **OJOS:** Lávelos inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. **Consultar al oftalmólogo.**

Síntomas: La exposición excesiva de vapores puede causar irritación de las vías respiratorias. En este caso lleve al paciente a un lugar fresco y manténgalo en reposo.

Diagnóstico: Determinar sintomatológicamente.

Tratamiento: Es sintomático. No existe antídoto específico, el tratamiento depende del buen juicio del médico y la manera como reaccione el paciente.



Para mayor información diríjase a **FarmAgro S.A.**
Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7
Junto a Sal. Del Pacífico, Manzana 263
Parque Industrial Vergeles. Telefono: 04 2590600
Guayaquil, Ecuador.

