

# Programa de control de malezas en trigo



Abril 2013

\* Marca registrada de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow    Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar

Avenida Américo Vespucio Sur 100 piso 6, Las Condes, Santiago. Teléfono: (56 2) 2440 4800 - Fax: (56 2) 2440 4930 • [www.dowagro.cl](http://www.dowagro.cl)

Estado fenológico del trigo	Malezas	Producto	Observaciones
Barbecho químico	Malezas gramíneas y latifoliadas anuales y perennes.	<b>Panzer<sup>®</sup> Gold + Starane<sup>®</sup> Xtra</b>	Utilizar de preferencia en presencia de poligonáceas (vinagrillo, sanguinaria, duraznillo, romaza, porotillo) y/o malezas difíciles de controlar o tolerantes a glifosato. Starane <sup>®</sup> Xtra presenta sinergia con Panzer <sup>®</sup> Gold, lo cual ofrece una mejor eficacia de la mezcla herbicida.
		<b>Panzer<sup>®</sup> Gold + Esteron<sup>®</sup> Ten Ten</b>	En presencia de hierba azul, compuestas (hierba del chancho, diente de león, chinilla, margarita, manzanillón, senecio, etc) y crucíferas.
Preemergencia	<p><b>Malezas latifoliadas de semilla:</b> bledo, cerastio, calabacillo, correhuela, quingüilla, hierba de la culebra, sanguinaria, porotillo, verdolaga, pasto pinito, quilloi-quilloi, verónica y ortiga.</p> <p><b>Malezas gramíneas de semilla:</b> vulpia, chéptica, cola de zorro, hualcacho, bromo, ballicas, pasto de la perdiz, poa o piojillo, maicillo, pasto cebolla, setaria y pega-pega.</p>	<b>Treflan<sup>®</sup> o Espada<sup>®</sup></b>	Aplicar en preemergencia del cultivo, después de la siembra, idealmente sobre suelo húmedo. Usar sólo en suelos rojo arcillosos o trumaos. No se recomienda incorporar mecánicamente una vez aplicado. Lluvias ocurridas durante la semana siguiente a la aplicación incorporarán el herbicida.
Postemergencia	<p><b>Malezas gramíneas:</b> pasto de la perdiz, pasto miel, avenilla*, ballicas*, cola de zorro*, bromos, vulpia.</p> <p><b>Malezas latifoliadas:</b> alfilerillo, vicia, bolsita del pastor, calabacillo, diente de león, hierba de San Juan, hierba del chancho, hierba mora, hualputra, lengua de gato, llantén, manzanillón, manzanilla, mostacilla, pasto pinito, quilloi-quilloi, rábano, romaza, senecio, siete venas, tréboles, verónica, vinagrillo, verdolaga, viola, yuyo, zanahoria silvestre.</p>	<b>Admitt<sup>®</sup></b>	Aplicar en postemergencia temprana del cultivo, cuando las malezas presenten 2 - 3 hojas y estén creciendo activamente y hasta 1 - 2 macollas en el caso de las gramíneas. Para ampliar y/o reforzar el espectro de control se recomienda mezclar Admitt <sup>®</sup> en dosis de 320 g/ha con Lontrel <sup>®</sup> 3A, Preside <sup>®</sup> 80WG, Starane <sup>®</sup> , Combo <sup>®</sup> o Metsulfurón. También se puede mezclar con Vulcano**. En este último caso, la dosis de Admitt <sup>®</sup> debe ser de 240 g/ha. Debe mezclarse con un surfactante no iónico.

\*Es posible que existan ecotipos de algunas especies de gramíneas resistentes a Admitt<sup>®</sup>, cuyo control podría ser deficiente.

\*\* Marca registrada de Arysta LifeScience

Estado fenológico del trigo	Malezas	Producto	Observaciones
Postemergencia	Malezas latifoliadas. En general aplicar con malezas de menor desarrollo y creciendo activamente.	<b>Combo<sup>®</sup> + Preside<sup>®</sup> 80WG</b>	Malezas en primeros estados. Aplicar desde las 3 - 4 hojas verdaderas hasta fin de macolla. Mezcla de amplio espectro de control, incluyendo malezas difíciles como viola, crucíferas, vinagrillo y sanguinaria.
		<b>Combo<sup>®</sup> + Starane<sup>®</sup> Xtra</b>	Aplicar desde 3 hojas a fin de macolla. Amplio espectro de control. Eficaz en malezas perennes o difíciles de controlar. Use dosis mayores de Starane <sup>®</sup> con malezas de mayor desarrollo. En presencia de crucíferas de mayor desarrollo, como rábano, agregar 25 g de Preside <sup>®</sup> 80 WG.
		<b>Combo<sup>®</sup> + DMA<sup>®</sup> 6</b>	Excelente control de cariofiláceas, poligonáceas, leguminosas, crucíferas y compuestas. Aplicar desde 5 hojas a fin de macolla con malezas en crecimiento activo. Evitar aplicar en situaciones de estrés, como heladas, suelos excesivamente secos o húmedos.
		<b>DMA<sup>®</sup> 6 + Tordon<sup>®</sup> 101</b>	Tordon <sup>®</sup> 101 controlará malezas tolerantes a 2,4D como sanguinaria, vinagrillo, galega. Aplicar desde 5 hojas a fines de macolla.
		<b>Starane<sup>®</sup> Xtra</b>	Aplicar con el cultivo desde 3 hojas hasta fin de macolla. Utilizar un mojamiento de 100 - 200 L agua/ha. Buen control de vinagrillo, arvejilla, pasto pinito, lengua de gato, quilloi-quilloi, sanguinaria, senecio, galega, yuyo y rábano. Starane <sup>®</sup> Xtra puede ser mezclado con DMA <sup>®</sup> 6, Metsulfurón, Combo <sup>®</sup> o Preside <sup>®</sup> 80 WG. Temperaturas bajo 7°C y heladas antes o después de la aplicación reducirán la eficacia de ésta.
		<b>Lontrel<sup>®</sup> 3A</b>	Efectivo control de leguminosas, manzanilla, manzanillón y otras compuestas. Selectivo a cereales desde 3 hojas hasta el estado de hoja bandera (al aplicar con otros productos, ceñirse a las recomendaciones de éstos). Seleccione la dosis según el estado de desarrollo y la temperatura. Recomendable su uso en mezclas con otros herbicidas postemergentes en trigo para ampliar su espectro de acción, incluso en ecotipos de manzanillón resistente a ALS.
		<b>DMA<sup>®</sup> 6</b>	Aplice las dosis mínimas para malezas en sus primeros estados de desarrollo. Control de crucíferas, leguminosas y compuestas. Recomendable su uso en mezclas para ampliar su espectro de acción. Aplicar desde 5 hojas a fines de macolla. Controla ecotipos de crucíferas resistentes a ALS.